ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si.Di.Mar.
Sistema Difesa Mare

Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene

Classe Bacillariophyceae

Ordine Naviculales

Famiglia Diploneidaceae

Diploneis interrupta (Kutzing) Cleve, 1894

SINONIMI RILEVANTI *Navicula interupta* Kutzing, 1844.



DESCRIZIONE
Valve fortemente panduriformi, con apici arrotondati. Le dimensioni variano da 40 a 80µm. Provvisti centralmente di protuberanze, pronunciate verso entrambi gli apici delle valve.

COLORAZIONE
Non descritta.

FORMULA MERISTICA
-

TAGLIA MASSIMA
Lunghezza delle valve 40–80 µm.

STADI LARVALI
-

SPECIE SIMILI
-

CARATTERI DISTINTIVI
-

HABITAT
Specie bentonica, epipsammica.

COROLOGIA / AFFINITA'
Specie boreale Atlantica.

DISTRIBUZIONE ATTUALE
Atlantico (Olanda), Mar Baltico (Svezia).

PRIMA SEGNALAZIONE IN MEDITERRANEO
Laguna di Venezia 1999.

PRIMA SEGNALAZIONE IN ITALIA
Laguna di Venezia 1999.

ORIGINE
Mar Baltico.

VIE DI DISPERSIONE PRIMARIE
Sconosciute.

VIE DI DISPERSIONE SECONDARIE
-

STATO DELL'INVASIONE
Sconosciuto.

MOTIVI DEL SUCCESSO
Sconosciuti.

Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene

PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI

Sconosciute.

BIOLOGIA

Epifita, soprattutto d'estate, su alghe rosse.

SPECIE IN COMPETIZIONE

-

IMPATTI

-

DANNI ECOLOGICI

-

DANNI ECONOMICI

-

IMPORTANZA PER L'UOMO

Sconosciuta

BANCA DEI CAMPIONI

-

PRESENZA IN G-BANK -

PROVENIENZA DEL CAMPIONE

TIPOLOGIA: (MUSCOLO / ESEMPLARE INTERO / CONGELATO / FISSATO ECC)

LUOGO DI CONSERVAZIONE

CODICE CAMPIONE

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si.Di.Mar.
Sistema Difesa Mare

Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene

BIBLIOGRAFIA