



Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene


Classe Bacillariophyceae

Ordine Naviculales

Famiglia Pleurosigmataceae

Gyrosigma fascicola
(Ehrenberg) Griffith & Henfrey,
1856

SINONIMI RILEVANTI *Ceratoneis fascicola* Ehrenberg, 1840;
Pleurosigma fascicola (Ehrenberg) W. Smith,
1852.



DESCRIZIONE

Valve lanceolate con estremità curvate in direzioni opposte e leggermente rigonfie. Lunghezza delle valve 103-132µm. Pennata.

COLORAZIONE

Non descritta.

FORMULA MERISTICA

-

TAGLIA MASSIMA

Lunghezza delle valve 103-132µm.

STADI LARVALI

-

SPECIE SIMILI

-

CARATTERI DISTINTIVI

-

HABITAT

Specie bentonica.

COROLOGIA / AFFINITA'

Specie boreale Atlantica.

DISTRIBUZIONE ATTUALE

Atlantico (Olanda, Francia, Portogallo), Mar Nero.

PRIMA SEGNALAZIONE IN MEDITERRANEO

Golfo di Lione (Francia) 1996.

PRIMA SEGNALAZIONE IN ITALIA

Laguna di Venezia 1999.

ORIGINE

Oceano Atlantico.

VIE DI DISPERSIONE PRIMARIE

Sconosciute.

VIE DI DISPERSIONE SECONDARIE

-

STATO DELL'INVASIONE

Sconosciuto.

MOTIVI DEL SUCCESSO

Sconosciuti.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene

PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI

Sconosciute.

BIOLOGIA

Sconosciuta.

SPECIE IN COMPETIZIONE

-

IMPATTI

-

DANNI ECOLOGICI

-

DANNI ECONOMICI

-

IMPORTANZA PER L'UOMO

Sconosciuta

BANCA DEI CAMPIONI

-

PRESENZA IN G-BANK -

PROVENIENZA DEL CAMPIONE

**TIPOLOGIA: (MUSCOLO / ESEMPLARE INTERO /
CONGELATO / FISSATO ECC)**

LUOGO DI CONSERVAZIONE

CODICE CAMPIONE



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Sistema Difesa Mare

Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene

BIBLIOGRAFIA

