



Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene


Classe Bacillariophyceae

Ordine Bacillariales

Famiglia Bacillariaceae

Nitzschia dissipata
(Kützing) Grunow, 1862

SINONIMI RILEVANTI *Synedra dissipata* Kützing 1844;
Nitzschia minutissima W. Smith, 1853.



DESCRIZIONE

Valve di forma strettamente lanceolata. Lunghezza delle valve 27-38µm. Apici sub-rostrati.

COLORAZIONE

Non descritta.

FORMULA MERISTICA

-

TAGLIA MASSIMA

Lunghezza delle valve 60 - 120 µm.

STADI LARVALI

-

SPECIE SIMILI

-

CARATTERI DISTINTIVI

-

HABITAT

Specie bentonica.

COROLOGIA / AFFINITA'

Specie boreale Atlantica.

DISTRIBUZIONE ATTUALE

Mar Baltico (Svezia, Lettonia), Mar Nero.

PRIMA SEGNALEZIONE IN MEDITERRANEO

Venezia 1993.

PRIMA SEGNALEZIONE IN ITALIA

Venezia 1993.

ORIGINE

Oceano Atlantico, Mar Baltico.

VIE DI DISPERSIONE PRIMARIE

Sconosciute.

VIE DI DISPERSIONE SECONDARIE

-

STATO DELL'INVASIONE

Sconosciuto.

MOTIVI DEL SUCCESSO

Sconosciuti.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene

PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI

Sconosciute.

BIOLOGIA

Sconosciuta.

SPECIE IN COMPETIZIONE

-

IMPATTI

-

DANNI ECOLOGICI

-

DANNI ECONOMICI

-

IMPORTANZA PER L'UOMO

Sconosciuta

BANCA DEI CAMPIONI

-

PRESENZA IN G-BANK -

PROVENIENZA DEL CAMPIONE

**TIPOLOGIA: (MUSCOLO / ESEMPLARE INTERO /
CONGELATO / FISSATO ECC)**

LUOGO DI CONSERVAZIONE

CODICE CAMPIONE



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Sistema Difesa Mare

Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene

BIBLIOGRAFIA

