



Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene



Classe Bacillariophyceae

Ordine Bacillariales

Famiglia Bacillariaceae

Nitzschia tryblionella
Hantzsch in Rabenhorst, 1860

SINONIMI RILEVANTI *Tryblionella gracilis* W. Smith, 1853;
Tryblionella hantzschiana.



DESCRIZIONE

Valve lanceolate o oblunco-lanceolate. Lunghezza delle valve 70-180µm.

COLORAZIONE

Non descritta.

FORMULA MERISTICA

-

TAGLIA MASSIMA

Lunghezza delle valve 70 - 180 µm.

STADI LARVALI

-

SPECIE SIMILI

-

CARATTERI DISTINTIVI

-

HABITAT

Specie bentonica.

COROLOGIA / AFFINITA'

Specie boreale Atlantica.

DISTRIBUZIONE ATTUALE

Atlantico (isole Britanniche), Mar Nero, Mare del Nord.

PRIMA SEGNALAZIONE IN MEDITERRANEO

Venezia 1993.

PRIMA SEGNALAZIONE IN ITALIA

Venezia 1993.

ORIGINE

Oceano Atlantico.

VIE DI DISPERSIONE PRIMARIE

Sconosciute.

VIE DI DISPERSIONE SECONDARIE

-

STATO DELL'INVASIONE

Sconosciuto.

MOTIVI DEL SUCCESSO

Sconosciuti.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene

PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI

Sconosciute.

BIOLOGIA

Sconosciuta.

SPECIE IN COMPETIZIONE

-

IMPATTI

-

DANNI ECOLOGICI

-

DANNI ECONOMICI

-

IMPORTANZA PER L'UOMO

Sconosciuta

BANCA DEI CAMPIONI

-

PRESENZA IN G-BANK -

PROVENIENZA DEL CAMPIONE

**TIPOLOGIA: (MUSCOLO / ESEMPLARE INTERO /
CONGELATO / FISSATO ECC)**

LUOGO DI CONSERVAZIONE

CODICE CAMPIONE



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Sistema Difesa Mare

Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene

BIBLIOGRAFIA

